VIDAL 2008
Parapharmacie

CE VISMED® solution oculaire

hyaluronate de sodium à 0,18 %

Formes et présentations | Composition | Propriétés | Indications | Précautions d'emploi | Contre-indications | Mode d'emploi | Renseignements administratifs

FORMES et PRÉSENTATIONS (début page)

Solution stérile pour usage ophtalmique topique : Boîte de 20 doses de 0,3 ml, à usage unique.

COMPOSITION (début page)

Hyaluronate de sodium : 1,8 mg/ml ; chlorure de sodium, de potassium, de magnésium, de calcium ; hydrogénophosphate disodique ; citrate de sodium ; eau pour préparation injectable. Sans agent conservateur.
La solution est hypotonique.

INDICATIONS (début page)

Sensations modérées et sévères de sécheresse oculaire.

CONTRE-INDICATIONS (début page)

- Hypersensibilité à l'un des composants du produit.
- Ne pas administrer Vismed en même temps que d'autres produits ou médicaments ophtalmiques car il pourrait en modifier les effets.

PROPRIÉTÉS (début page)

Vismed contient du hyaluronate de sodium, un polymère naturel également présent dans les structures de l'oeil humain. Les caractéristiques physiques particulières du hyaluronate de sodium lui permettent de se lier à un très grand nombre de molécules d'eau. Ces caractéristiques physiques confèrent à Vismed une visco-élasticité unique. Ainsi, Vismed assure à la surface de l'oeil la formation d'un film uniforme qui résiste au processus naturel d'élimination par les battements de paupières. Vismed garantit donc un confort maximal et prolongé. Vismed ne contient pas d'agent conservateur et est très bien toléré.

MODE D'EMPLOI (début page)

Tourner et détacher la partie supérieure pour ouvrir.
Mettre 1 à 2 gouttes de Vismed dans le cul-de-sac conjonctival aussi souvent que nécessaire ou selon la prescription du médecin. Quelques clignements des paupières assureront une répartition uniforme de la solution sur la surface oculaire en un film transparent et durable. Vismed peut être utilisé pendant le port de lentilles de contact, quelqu'en soit le type (souple ou rigide).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (début page)

Ne pas toucher la partie ouverte de l'unidose avec les doigts et éviter de la mettre directement en contact avec l'oeil. Ne pas utiliser Vismed si l'unidose est endommagée. Vismed ne contenant pas d'agent conservateur, ne pas réutiliser le contenu de l'unidose après son ouverture. A conserver entre 2 °C et 25 °C.
Si les troubles persistent pendant l'utilisation de Vismed ou après l'arrêt du traitement, consulter le médecin.
Tenir hors de portée des enfants.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (début page)

Tarif LPPR : 3.25 euros (20 doses de 0,3 ml).
Prix conseillé : 10.00 euros .
Code LPPR : 1163922. Code Prestation AAD.
ACL 749 360.3 .
Prescription par un ophtalmologiste, après diagnostic de kératite ou de kératoconjonctivite sèche et en troisième intention après échec des substituts lacrymaux de faible viscosité et des gels. Prescription ne pouvant excéder 6 mois. Renouvellement autorisé après examen ophtalmologique.
Dispositif médical, classe IIB CE 0123.
Fabricant : Chemedica AG, Pharmavertrieb, D 85540 Haar, München.

HORUS PHARMA
148, av Georges-Guynemer. Cap Var
06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél : 04 93 19 54 03. Fax : 04 93 19 54 09
Site web : www.horus-pharma.fr